

## **Contraccezione post-coitale**

Data Categoria

30 dicembre 2000 ginecologia

E' entrato in commercio, col nome Norlevo, il contraccettivo post-coitale di recente introduzione a base di levonorgestrel.

Indicazioni: contraccettivo d' emergenza da usare entro 72 ore da un rapporto sessuale non protetto.

Il trattamento e' tanto piu' efficace quanto prima viene iniziato.

Posologia: due compresse. La prima compressa va assunta quanto prima, possibilmente entro 12 ore; la seconda 12 ore dopo (o al massimo 24 ore dopo). Puo' essere assunto in qualunque momento del ciclo mestruale, e non controindica la prosecuzione di una contraccezione ormonale "normale". Controindicazioni: Ipersensibilita' al principio attivo.

Non va somanatrato in soggetti a rischio di gravidanza extrauterina in quanto non si puo' escludere che tale

eventualita' possa verificarsi.

E' sconsigliato nelle gravi epatopatie. Nelle sindromi da malassorbimento l' effetto potrebbe essere compromesso. In caso di vomito entro 3 ore dall' assunzione, questa va ripetuta. La mestruazione successiva si presenta, di solito, nella data prevista, con possibilita' di anticipo o ritardo di qualche giorno.

Il farmaco non interrompe una gravidanza in atto. Viene secreto nel latte.

L' efficacia del farmaco puo' diminuire per interferenza con farmaci induttori degli enzimi epatici. Effetti collaterali principali: nausea, dolori addominali bassi, astenia, cefalea, capogiro, dolorabilita' mammaria.

Sui problemi etici della contraccezione post-coitale, pubblicheremo a breve autorevoli pareri. DanieleZamperini