erapia Ormonale Sostitutiva (TOS): aumenta, in certi casi, l’incidenza del carcinoma ovari

Data 30 ottobre 2002
Categoria ginecologia

Studio retrospettivo di coorte con dati ottenuti dal Breast cancer Detection Project (1979-1988) per accertare se la TOS aumenti il rischio di carcinoma ovarico.
Durante un follow-up medio di 13 anni, vi furono 329 diagnosi di carcinomi dell’ovaio su 44,241 donne in postmenopausa (età media di inizio del follow-up: 57 anni).
Mediante analisi ,multivariata si è determinato che l’uso di estrogeni da soli, a paragone del non utilizzo, era correlato ad un aumento del rischio di carcinoma dell’ovaio (RR= 1.6).
Il rischio era proporzionale al periodo di impiego degli estrogeni: il rischio relativo aumentava del 7% per ogni anno di impiego.
Quando gli estrogeni venivano impiegati unitamente ai progestinici , dopo un periodo di impiego di soli estrogeni, il rischio di carcinoma dell’ovaio aumentava di 1.5 volte, a paragone con il non impiego di trattamento ormonale.
L’impiego di terapia combinata estro-progestinica dall’inizio non si associava invece ad aumento di rischio di carcinoma ovarico.

JAMA 2002 Jul 17; 288: 334-41

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 14/11/2026 alle ore 23:31 | Pagina 1 di 1