Anabolizzanti e capacità erettile

Data 26 gennaio 2001
Categoria andrologia

Da molto tempo si discute se gli anabolizzanti assunti dagli atleti o dai culturisti per gonfiare i muscoli siano capaci di ridurre nel tempo la capacita’ sessuale maschile. Non c’e’ unanimita’ di vedute sulla situazione. Una recente ricerca condotta da G. Piubello, andrologo e endocrinologo di Verona, avrebbe evidenziato che tali farmaci, assunti cronicamente, riducono il desiderio sessuale e la capacita’ di fecondare. L’autore ha analizzato 20 culturisti di eta’ compresa tra 19 e 26 anni, consumatori abituali di anabolizzanti. Ha evidenziato bassi livelli di testosterone e inoltre 17 soggetti hanno mantenuto ridotti livelli di ormoni maschili anche nei periodi di pausa tra un ciclo di somministrazione e l’altro. I cicli erano normalmente di 40-70 giorni con pausa di 20 giorni. Tutti gli esami seminali infine hanno evidenziato una considerevole diminuzione degli spermatozoi. Quindi i culturisti sembrano trovarsi al bivio: muscoli o virilita’.

(ADN Kronos Salute)

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 20/11/2026 alle ore 22:29 | Pagina 1 di 1