Ipertiroidismo subclinico e rischio di demenza

Data 27 maggio 2001
Categoria endocrinologia

Gli autori dello studio hanno preso in esame la relazione tra funzione tiroidea e rischio di demenza di Alzheimer in una popolazione di ultra 55enni randomizzati tra la popolazione del Rotterdam Study. 1843 soggetti sono stati studiati nel periodo 1990-1993 attraverso la misurazione del TSH , degli anticorpi anti TPO e del T4 nei casi con TSH abnorme. I partecipanti sono stati valutati(all'inizio dello studio e durante il follow up per un tempo medio di 2 anni)per la demenza di Alzheimer secondo i criteri internazionali. I soggetti con riduzione del TSH hanno mostrato un rischio aumentato di sviluppare la demenza di Alzheimer (RR = 3·5, 95%CI).Anche i livelli elevati di T4 sembrano associati ad un aumentato rischio. I soggetti con TSH ridotto ed elevato titolo anticorpale anti TPO hanno il rischio più elevato di ammalare di demenza (RR = 23·7) In conclusione questo è il primo studio che evidenzia una correlazione tra demenza e Ipertiroidismo subclinico nell'anziano.
Clinical Endocrinology 53 (6), 733-737

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 6/11/2026 alle ore 12:21 | Pagina 1 di 1