Utilita' della sertralina nel disordine da stress post-traumatico (PTSD)

Data 27 giugno 2001
Categoria psichiatria_psicologia

Il disordine da stress post-traumatico si associa generalmente ad una significativa disabilita'. Si e' voluto indagare l' efficacia del trattamento con sertralina a confronto con placebo, in uno studio multicentrico in doppio cieco della durata di 12 settimane.. Sono stati randomizzati 208 pazienti con forma moderata o severa, valutata con una serie di scale (CAPS-2, IES, CGI-S, CGI-I).
L' analisi dei risultati ha evidenziato un significativo vantaggio della sertralina rispetto al placebo; la sertralina si e' inoltre mostrata ben tollerata, con il 9% di interruzioni del trattamento secondarie ad effetti collaterali, rispetto al 5% del placebo. Gli effetti collaterali consistevano essenzialmente in insonnia, diarrea, nausea, inappetenza.
Gli autori concludono che la sertralina si e' mostrata utile, efficace e ben tollerata nel trattamento della sindrome da stresspost-traumatico.
Arch Gen Psychiatry. 2001;58:485-492

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 15/11/2026 alle ore 9:13 | Pagina 1 di 1