



Nuove linee guida per lo screening del cancro del Colon

Data 27 luglio 2001
Categoria oncologia

L'American Medical Association ha diffuso le nuove linee guida per lo screening del cancro del colon/retto. Il Cancro del colon retto è negli USA il terzo cancro per frequenza sia nelle donne che negli uomini. Nonostante l'evidenza della utilità della diagnosi precoce e nonostante l'evidente riduzione della mortalità legata alla diagnosi precoce una percentuale troppo esigua della popolazione si sottopone allo screening mediante ricerca del sangue occulto e colonscopia. Essendo noto che il cancro del Colon è caratterizzato da una lunga fase preclinica che il più delle volte inizia con polipi adenomatosi la cui asportazione previene la trasformazione cancerosa non bisogna sottovalutare l'importanza dello screening.

Raccomandazioni: Tutti i soggetti di età maggiore o uguale a 50 anni, asintomatici e senza altri fattori di rischio devono essere screenati con :

Ricerca del sangue occulto nelle feci annuale e/o colonscopia ogni 5 anni o

Colonscopia ogni 10 anni o

Clisma opaco con doppio mezzo di contrasto ogni 5-10 anni

Sorveglianza per soggetti ad alto rischio con colonscopia ad intervalli personalizzati per età, rischio, comorbidità è giustificata:

In caso di storia personale di cancro coloretale o di polipi adenomatosi

In caso di familiarità per cancro del colon/retto o polipi in familiari di I grado

In caso di malattie infiammatorie dell'intestino come Colite Ulcerosa e Morbo di Crohn

Fonte: American Medical Association