Nuove controindicazioni per l' Acido Acetilsalicilico agli adolescenti

Data 29 settembre 2004
Categoria professione

Il DECRETO Ministeriale 24 giugno 2004 (GU n. 165 del 16-7-2004) ha comportato una serie di sostanziali modifiche alla prescrivibilita', tali da modificare sostanzialmente le abitudini dei medici e dei pazienti, specificamente per i soggetti di eta' inferiore ai 16 anni.

Riassumiamosinteticamente:

Le confezioni che riportino indicazioni consentite per i soggetti di eta' inferiore a 16 anni devono essere prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica.
Le indicazioni consentite per i soggetti di eta' inferiore ai 16 anni sono:
artrite reumatoide infantile;
malattia reumatica;
malattia di Kawasaki;
antiaggregante piastrinico.
Le confezioni devono inoltre riportare l' avvertenza:
"Questo medicinale non va utilizzato in corso di affezioni virali, come ad esempio varicella o influenza, a causa del rischio di sindrome di Reye".
E' molto importante che i medici si adeguino a queste nuove disposizioni, in quanto potrebbero dover rispondere, altrimenti, per responsabilita' professionale.
DanieleZamperini

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 13/11/2026 alle ore 21:2 | Pagina 1 di 1