



## Diabete gestazionale meglio se lo screening avviene presto.

---

**Data** 30 settembre 2002  
**Categoria** ostetricia

---

Eeguire lo screening per diabete a 16 settimane è più efficace per la ricerca del diabete gestazionale e offre la possibilità di trattare precocemente la malattia evitando complicazioni alla madre e al feto. Alcuni Ostetrici tendono a screenare le pazienti per il diabete nel terzo trimestre di gravidanza ritenendo che il test in questo periodo sia più accurato. Tuttavia il test eseguito a 16 settimane permette di focalizzare l'attenzione sulle pazienti ad alto rischio prima ed inoltre è un ottimo predittore di diabete gestazionale e può essere facilmente incluso nei controlli ematologici che le donne in gravidanza eseguono in questo periodo.

Secondo il Dr. Nahum, autore dello studio, le donne che a 16 settimane di gestazione hanno valori glicemici inferiori a 110 mg/dl hanno il 99,4 % di possibilità di non sviluppare un diabete gestazionale, nessuna delle pazienti con glicemia inferiore a 104 mg/dl ha sviluppato un diabete gestazionale. Per le pazienti comprese nel rane 111 mg/dl -134 mg/dl di glucosio a 16 settimane lo screening andrebbe ripetuto a 28 settimane .

Fonte: [www.docguide.com](http://www.docguide.com)