I contraccettivi orali di seconda e terza generazione sono efficaci nel trattamento dell’acne

Data 30 dicembre 2003
Categoria dermatologia

Lo studio ha confrontato l’efficacia clinica dei contraccettivi orali di seconda e terza generazione nel trattamento dell’acne.
Un totale di 34 donne con acne è stato assegnato in modo random a ricevere un contraccettivo orale contenente 0,3 mg di Etinil Estradiolo / 0,15 di Desogestrel oppure 0,3 mg di Etinil Estradiolo / 0,15 mg di Levonorgestrel , per 9 mesi.
Il numero delle lesioni acneiche si è ridotto in modo significativo in entrambi i gruppi rispetto al basale (p< 0.02).
Dopo 9 mesi di terapia, l’acne si è ridotta del 52,8% nel gruppo Etinil Estradiolo / Levonorgestrel (n=9) e del 58,5% nel gruppo Etinil Estradiolo / Desogestrel (n=7).
La globulina legante l’ormone sessuale (SHBG) si è ridotta mediamente di 46,3 nmol/L nel gruppo Etinil Estradiolo / Desogestrel e di 20,0 nmol/l nel gruppo Etinil Estradiolo / Levonorgestrel (p< 0.05).

Am J Obstet Gynecol 2003

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 19/11/2026 alle ore 19:49 | Pagina 1 di 1