Decorso clinico della psoriasi durante la gravidanza

Data 30 dicembre 2003
Categoria dermatologia

I cambiamenti fisiologici che avvengono durante la gravidanza inducono remissione della malattia infiammatoria in diversi casi.
I Ricercatori del Psoriasis Research Institute e della Stanford School of Medicine hanno studiato il decorso clinico della psoriasi nel corso della gravidanza.
Lo studio retrospettivo si è avvalso dei dati di 736 questionari.
Nella maggior parte dei pazienti la psoriasi è migliorata nel corso della gravidanza.
I dati su 91 gravidanze hanno mostrato un miglioramento nel 56% (n=51) dei casi ed un peggioramento nel 26,4% (n=24).
Non è stata osservata alcuna variazione nel 17,6% dei casi (n=16).
Le pazienti con miglioramenti nel corso della prima gravidanza hanno presentato una risposta simile nelle gravidanze successive.

Le citochine proinfiammatorie di tipo Th-1 sono risultate up-regolate nei pazienti con psoriasi.
E' probabile che durante la gravidanza si abbia una riduzione dell'up-regolazione delle citochine Th-1 a favore delle citochine Th-2.

Int J Dermatol 2003; 42:518-520

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 16/11/2026 alle ore 12:48 | Pagina 1 di 1