Trattamento dell’acne vulgaris negli adolescenti

Data 01 gennaio 2004
Categoria dermatologia

La scelta della terapia dovrebbe essere principalmente basata sul tipo di lesioni e sulla gravità dell’acne, ma i problemi psicologici correlati alla malattia e la presenza di cicatrizzazione possono influenzare l’approccio al trattamento.
La forma lieve di acne richiede solo un trattamento topico.
Il Benzoil Perossido, l’Acido Azelaico e gli antibatterici sono generalmente impiegati nelle lesioni infiammatorie.
I retinoidi topici sono particolarmente efficaci nelle lesioni non infiammatorie, e le terapia di combinazione è utile nelle lesioni miste.
L’acne moderatamente grave generalmente richiede antibatterici orali.
Le tetracicline (Oxitetraciclina) e l’Eritromicina sono farmaci di prima scelta.
Le tetracicline di seconda generazione , come Limeciclina , Doxiciclina e Minociclina presentano un migliore assorbimento.
La Minociclina ha il vantaggio di indurre una minore resistenza nel Propionibacterium acnes , ma questo antibiotico può causare gravi effetti indesiderati.
Il Trimetoprim è un antibatterico di terza scelta e trova indicazione nei pazienti non responder ad altri trattamenti.
Il Benzoil Perossido dovrebbe essere impiegato in associazione ad antibatterici con l’obiettivo di ridurre la resistenza batterica.
L’Isotretinoina è il farmaco di scelta nell’acne nodulare grave.
L’Isotretinoina è tuttavia associata a gravi effetti indesiderati, ed i pazienti dovrebbero essere tenuti sotto stretta osservazione.

Paediatric Drugs 2003 ; 5 : 301-313

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 16/11/2026 alle ore 12:45 | Pagina 1 di 1