



Studio PROSPER: statine e anziani

Data 01 gennaio 2004
Categoria cardiovascolare

La pravastatina nei soggetti anziani a rischio di malattia vascolare: trial randomizzato controllato.

Sebbene le statine riducano la morbilità e la mortalità per malattia coronarica e cerebrovascolare nei pazienti adulti, la loro efficacia e sicurezza nei pazienti anziani non è ancora completamente accertata. L'intenzione degli autori dello studio è stata quella di testare i benefici del trattamento con pravastatina in una coorte di uomini e donne anziani ad alto rischio per ictus e malattie cardiovascolari. Lo studio ha arruolato 2804 uomini e 3000 donne (5804 soggetti) di età compresa tra 70 e 82 anni con storia di malattia cardiovascolare o con fattori di rischio per malattia cardiovascolare e ha assegnato i pazienti in maniera randomizzata al trattamento con 40 mg die di pravastatina o al placebo. Il colesterolo al momento dell'arruolamento nello studio era compreso nel range 4-9 mmol/L. Il follow up è durato 3,2 anni in media gli endpoint dello studio sono stati: morte coronarica, infarto miocardico non fatale, ictus fatale, ictus non fatale:

Risultati: Pravastatina ha ridotto la concentrazione di LDL di circa il 34 % e ha ridotto l'incidenza degli endpoint primari a 408 eventi contro i 473 del gruppo placebo($p= 0.014$), anche il rischio di morte coronarica e di infarto non fatale è stato ridotto ($p= 0.006$). Il rischio di ictus invece è rimasto immutato, mentre lievemente diminuito è risultato il rischio di T.I.A. Sono stati diagnosticati più cancri nel gruppo trattato con pravastatina rispetto al gruppo placebo. Ciononostante includendo questi dati in una meta-analisi di tutti i trial su pravastatina e statine non vi è evidenza di un aumento del rischio globale. La mortalità per malattia coronarica si è ridotta del 24 % nel gruppo trattato con pravastatina. La pravastatina non ha però alcun effetto su funzioni cognitive o su disabilità neurologiche.

Interpretazione: La Pravastatina data per 3 anni riduce il rischio di malattia coronarica nei pazienti anziani, lo studio PROSPER estende ai pazienti anziani le strategie terapeutiche correntemente in uso per i pazienti più giovani.

Lancet. 2002 Nov 23;360(9346):1623-30