Fumo e carcinoma pancreatico familiare

Data 01 gennaio 2004
Categoria oncologia

Il 10% circa dei carcinomi pancreatici sono ereditari, ma i fattori alla base della oncogenesi nel carcinoma pancreatico familiare non sono noti.
I Ricercatori della Divisione di Gastroenterologia dell' University of Washington negli Usa hanno valutato i fattori di rischio per il carcinoma pancreatico familiare in 251 membri di 28 famiglie.
Tutte le famiglie comprendevano 2 o più membri con carcinoma pancreatico.
Il fumo è risultato essere un fattore di rischio indipendente per il carcinoma pancreatico familiare (odds ratio: 3,7) ; i maschi ed i soggetti d'età inferiore a 50 anni hanno presentato un odds ratio (OR) di 5,2.
I fumatori hanno sviluppato il tumore al pancreas una decade prima dei non fumatori (59,6 versus 69,1 anni).
Il diabete non si è rivelato un fattore di rischio per il carcinoma pancreatico , sebbene il diabete sia risultato associato alla displasia pancreatica.
I membri di famiglie in cui il carcinoma pancreatico è ereditario non dovrebbero fumare.

Gastroenterology 2003; 124:1292-1299

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 13/11/2026 alle ore 23:13 | Pagina 1 di 1