La tintarella artificiale aumenta il rischio di sviluppare melanomi

Data 14 ottobre 2006
Categoria dermatologia

Abbronzarsi con lampade UVA o UVB aumenta il rischio di melanoma e la Commissione cambierà gli standard e la regolamentazione della materia.

La Commissione scientifica sui prodoti di consumo (SCCP) della UE ha pubblicato un parere sulla sicurezza dei lettini abbronzanti. Il parere del comitato scientifico è stato che i solarium, sia ad UVB che ad UVA, possono aumentare il rischio di melanoma cutaneo e possibilmente anche oculare. Pertanto i soggetti a rischio (fototipo I e II, età minore di 18 anni e storia di melanoma personale o familiare) dovrebbero essere informate dei rischi e dovrebbe esser loro raccomandato di evitare di usare tali metodi abbronzanti.
La Commissione pertanto intende modificare il disciplinare tecnico normativo che regolamenta la materia (EN 60335-2-27:1997), limitando la quantità di UV emessi dai solarium, dettando regole tecniche alle industrie e fornendo raccomandazioni agli Stati Membri affinché tali avvertenze siano rese operative al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.

Fonte:UE

documento del SCCP: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/sccp_cons_03_en.htm

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 16/11/2026 alle ore 14:58 | Pagina 1 di 1