

Tamsulosina e sindrome dell'iride a bandiera

Data 04 settembre 2006 Categoria professione

Aggiornata l'AIC della tamsulosina con l'aggiunta della sindrome dell'iride a bandiera intraoperatoria.

Estratto provvedimento n. UPC/R/42 del 09.08.06 (e altri analoghi), Gazzetta Ufficiale n. 204 del 02.09.06

Con tre provvedimenti analoghi (Omnic, Tamsulosina Astellas Pharma Europe, Pradif) viene modificata l'AIC della Tamsulosina con l'aggiunta, tra gli effetti collaterali, della sindrome dell'iride a bandiera intraoperatoria. E' una sindrome che è stata osservata durante chirurgia della cataratta mediante tecnica di facoemulsificazione: è stata descritta sia in pazienti che stavano ancora assumendo il farmaco al momento dell'intervento, sia in pazienti in cui il trattamento era stato sospeso poco prima (da 2 a 14 giorni) e molto prima (da 5 settimane a 9 mesi) della chirurgia. Essa si caratterizzata dalla combinazione di iride flaccida, che ondeggia in risposta all'irrigazione intraoperatoria, miosi progressiva intraoperatoria, nonostante la dilatazione preoperatoria con farmaci midriatici, e potenziale prolasso dell'iride alle incisioni durante la tecnica di facoemulsificazione.

vai a medico e leggi