



## Tamsulosina e sindrome dell'iride a bandiera

---

**Data** 04 settembre 2006  
**Categoria** professione

---

Aggiornata l'AIC della tamsulosina con l'aggiunta della sindrome dell'iride a bandiera intraoperatoria.


---

### **Estratto provvedimento n. UPC/R/42 del 09.08.06 (e altri analoghi), Gazzetta Ufficiale n. 204 del 02.09.06**

Con tre provvedimenti analoghi (Omnice, Tamsulosina Astellas Pharma Europe, Pradif) viene modificata l'AIC della Tamsulosina con l'aggiunta, tra gli effetti collaterali, della sindrome dell'iride a bandiera intraoperatoria.

E' una sindrome che è stata osservata durante chirurgia della cataratta mediante tecnica di facoemulsificazione: è stata descritta sia in pazienti che stavano ancora assumendo il farmaco al momento dell'intervento, sia in pazienti in cui il trattamento era stato sospeso poco prima (da 2 a 14 giorni) e molto prima (da 5 settimane a 9 mesi) della chirurgia.

Essa si caratterizza dalla combinazione di iride flaccida, che ondeggia in risposta all'irrigazione intraoperatoria, miosi progressiva intraoperatoria, nonostante la dilatazione preoperatoria con farmaci midriatici, e potenziale prolasso dell'iride alle incisioni durante la tecnica di facoemulsificazione.

 [vai a medico e leggi](http://www.medicoeleggi.com/argomenti00/modificheaic/100945pillole.htm)