



Antipsicotici in pazienti affetta da demenza - Comunicato AIFA

Data 09 gennaio 2007
Categoria professione

Trattamento farmacologico dei disturbi psicotici nei pazienti affetti da demenza.

Comunicato AIFA 08.01.07

L'AIFA è ritornata sulla problematica del trattamento dei disturbi psicotici e compartimentali nei pazienti affetti da demenza con farmaci antipsicotici di prima e seconda generazione.

Come è noto, l'uso di tali farmaci in questa indicazione non è contemplata in scheda tecnica.

Il [comunicato](http://www.agenziafarmaco.it/aifa/servlet/wscs_render_attachment_by_id/111.55236.1168274545032.pdf?id=111.52008.1168271357654) in oggetto prevede che:

- la prescrizione di tali farmaci nella demenza dovrà essere effettuata attraverso i centri specialistici autorizzati, identificati dalle regioni, con la procedura di rimborsabilità, da parte del SSN, in regime di distribuzione diretta;
- le aziende sanitarie dovranno adottare il modello unico di scheda per la prescrizione di inizio trattamento e una serie di schede di monitoraggio per ogni paziente con diagnosi di demenza e in trattamento con antipsicotici;
- le visite di monitoraggio devono avere cadenza bimestrale pertanto la dispensazione degli antipsicotici non deve superare i 60 giorni di terapia;
- le schede dovranno essere trasmesse al Servizio Farmaceutico della ASL o alla Farmacia dell'azienda ospedaliera e dovranno essere custodite per eventuali approfondimenti e controlli;
- qualora insorgano reazioni avverse in relazione all'uso di questi farmaci, esse vanno segnalate con il modulo e le procedure del Servizio Nazionale di Farmacovigilanza.

Il provvedimento riporta anche il percorso clinico per la prescrizione di questi farmaci per i medici che operano nell'ambito dei Centri Specialistici, la [scheda di monitoraggio](http://www.agenziafarmaco.it/aifa/servlet/wscs_render_attachment_by_id/111.52138.1168271479281.pdf?id=111.52144.1168271479478) e quella [di monitoraggio-follow-up](http://www.agenziafarmaco.it/aifa/servlet/wscs_render_attachment_by_id/111.53156.1168272531111.pdf?id=111.52268.1168271578231).

La problematica dell'utilizzo di questi farmaci è stata ripetutamente affrontata in Pillole: si segnalano solo alcuni dei più recenticontributi

[Antipsicotici atipici nellademenza](http://www.pillole.org/public/aspnuke/news.asp?id=2652&sid=412903068)

[Antipsicotici atipici - cautelanell'uso](http://www.pillole.org/public/aspnuke/news.asp?id=2162&sid=412903068)

[Antipsicotici negli anziani e rischio di morte](http://www.pillole.org/public/aspnuke/news.asp?id=2137&sid=412903068)