Crema al pimecrolimus efficace nella dermatite atopica

Data 06 giugno 2003
Categoria dermatologia

Circa il 10%-15% dei bambini dei paesi sviluppati va incontro a dermatite atopica. La terapia di questa condizione patologica spesso è problematica. In questo studio si valuta l' effetto di una crema all'1% di Pimecrolimus, immunomodulatore selettivo non steroideo, in 186 bambini affetti da dermatite atopica di lieve o media entità. L'età dei pazienti variava da 3 a 23 mesi.
I pazienti vennero randomizzati per ricevere la crema al Pimecrolimus oppure placebo.
La terapia prevedeva 2 applicazioni per 2 mesi.
Al termine del trattamento si ebbe un numero significativamente superiore di risoluzione completa o quasi completa del quadro nel gruppo di trattamento (54.5% contro 23.8% del gruppo di controllo).
Il gruppo di trattamento mostrò un effetto rapido ed iniziale: nei primi 15 giorni la dermatite scomparve nel 37.4% dei casi.
Durante una fase successiva di 20 giorni i bambini trattati con placebo passarono al trattamento con Pimecrolimus e andarono incontro a risultati paragonabili al gruppo che continuava il Pimecrolimus.
In particolare la crema al Pimecrolimus si dimostrò in grado di eliminare o alleviare notevolmente il prurito nei due terzi deicasi.
Inoltre si dimostrò sicura in test clinici e di laboratorio, con assenza di effetti collaterali significativi.

Ho VC et al
Safety and efficacy of non-steroid pimecrolimus cream 1% in the treatment of atopic dermatitis in infants