

## Bisfosfonati e dolore muscoloscheletrico

Data 08 gennaio 2008 Categoria reumatologia

La FDa avverte circa la possibile associazione tra uso di bisfosfonati ed insorgenza di dolore muscoloscheletrico.

La FDA sottolinea la possibile associazione tra l'insorgenza di dolore muscoloscheletrico severo e disabilitante ed utilizzo di bisfosfonati.

Il dolore muscoloscheletrico, pur riportato nella scheda tecnica, può insorgere dopo giorni, mesi o anni dall'inizio della terapia con bisfosfonati. Alcuni pazienti hanno riferito la scomparsa del dolore dopo aver sospeso i bisfosfonati, mentre altri hanno riferito una risoluzione lenta e/o incompleta. I fattori di rischio correlati con l'insorgenza della sindrome algica sonoignoti.

Si tratta di un dolore diverso dalla sindrome simil-influenzale con reazione sistemica di fase acuta, contrassegnata da febbre, mialgie, brividi, dolore osseo e articolare che talora accompagna la somministrazione endovenosa di amino-bisfosfonati e che tende a risolversi con la prosecuzione dell'uso del farmaco.

Fonte: FDA http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/bisphosphonatesHCP.htm