



---

## Bisfosfonati e dolore muscoloscheletrico

---

**Data** 08 gennaio 2008  
**Categoria** reumatologia

---

La FDA avverte circa la possibile associazione tra uso di bisfosfonati ed insorgenza di dolore muscoloscheletrico.

---

La FDA sottolinea la possibile associazione tra l'insorgenza di dolore muscoloscheletrico severo e disabilitante ed utilizzo di bisfosfonati.

Il dolore muscoloscheletrico, pur riportato nella scheda tecnica, può insorgere dopo giorni, mesi o anni dall'inizio della terapia con bisfosfonati. Alcuni pazienti hanno riferito la scomparsa del dolore dopo aver sospeso i bisfosfonati, mentre altri hanno riferito una risoluzione lenta e/o incompleta. I fattori di rischio correlati con l'insorgenza della sindrome algica sono ignoti.

Si tratta di un dolore diverso dalla sindrome simil-influenzale con reazione sistemica di fase acuta, contrassegnata da febbre, mialgie, brividi, dolore osseo e articolare che talora accompagna la somministrazione endovenosa di amino-bisfosfonati e che tende a risolversi con la prosecuzione dell'uso del farmaco.

**Fonte:** FDA <http://www.fda.gov/cder/drug/InfoSheets/HCP/bisphosphonatesHCP.htm>