Paracetamolo entro un anno e rischio di asma

Data 20 settembre 2008
Categoria pediatria

L'uso di paracetamolo nel primo anno di vita risulta associato ad un rischio di asma , rinite e eczema a 6-7 anni.

Per valutare se l'esposizione al paracetamolo nel primo anno di vita per la cura della febbre fosse correlata all'isorgenza di disturbi respiratori a 6-7 anni sono stati valutati 205487 bambini di 6–7 anni di età da 73 centri in 31 paesi.

All'analisi multivariata l'uso di paracetamolo per il controllo della febbre nel primo anno di vita è risultato associato con un rischio incrementato (rispetto al non uso) di sintomi asmatici all'età di 6-7 anni (OR 1,46). L'uso attuale del paracetamolo è risultato associato, in modo dose dipendente, con un aumento del rischio di insorgenza di sintomi asmatici (1,61 e 3,23 per l'uso di dosi medio-elevate vs il non uso, rispettivamente.

L'uso di paracetamolo, sia nel primo anno che a 6-7 anni, è risultato inoltre associato con un aumento del rischio di sintomi rinocongiuntivitici e di eczema.

Conclusioni

Gli Autori concludono che l'uso di paracetamolo nel primo anno di vita ed anche nell'infnzia, è associato con un aumento del rischio di asma, rinocongiuntivite ed eczema all'età di 6-7 anni.

Riferimentobibliografico

1) The Lancet 2008; 372:1039-1048

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 14/11/2026 alle ore 11:35 | Pagina 1 di 1