Modifiche AIC in GU: Neo-Lotan Plus, Forzaar, Hizaar, Lortaan

Data 27 febbraio 2009
Categoria professione

Gazzetta Ufficiale: Modificate le indicazioni terapeutiche di Neo-Lotan Plus, Forzaar, Hizaar, Lortaan.

Neo-Lotan Plus, Forzaar, Hizaar:
Le nuove indicazioni terapeutiche, uguali per tutti e tre questi medicinali (associazioni di losartan + idroclorotiazide), sono:
"Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con losartan o idroclorotiazide da soli".
Lortaan:
Le nuove indicazioni terapeutiche sono:
"Trattamento dell'ipertensione essenziale. Trattamento della patologia renale in pazienti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2 con proteinuria ≥ 0,5 g/die nel contesto di una terapia antiipertensiva. Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica (in pazienti ≥ 60 anni), quando il trattamento con gli ACE inibitori non è considerato adatto a causa di incompatibilità, specialmente tosse, o controindicazione. I pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore non devono essere trasferiti a losartan. I pazienti devono avere una frazione di eiezione del ventricolo sinistro ≤ 40% e devono essere stabilizzati con il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica. Riduzione del rischio di ictus in pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra documentata con ECG (vedere paragrafo 5.1 Studio LIFE, Razza)".

Neo-Lotan Plus
Forzaar
Hizaar
Lortaan