

Modifiche AIC in GU: Clorochina Bayer, Cortison Chemicetina, Talofen

Data 29 maggio 2009 Categoria professione

Gazzetta Ufficiale: Modificata posologia e modo di somministrazione del Clorochina Bayer; modificate le indicazioni terapeutiche di Cortison Chemicetina e Talofen.

ClorochinaBayer:

Viene specificata posologia e modo di somministrazione, per adulti e bambini, per ognuna delle seguenti indicazioni terapeutiche: profilassi della malaria; terapia della malaria; trattamento dell'artrite reumatoide, del lupus eritematoso discoide cronico e del lupus eritematoso sistemico; amebiasi extraintestinale.

In particolare, viene richiamata l'attenzione sulle dosi cumulative totali che possono essere somministrate e sulla durata complessiva del trattamento, in considerazione del fatto che dosi cumulative di clorochina base pari a 1 g/kg di p.c. oppure a 50-100 g complessivi sono state associate a danno retinico.

CortisonChemicetina:

Vengono modificate le indicazioni terapeutiche di unguento (trattamento topico di lesioni cutanee superficiali infiammatorie acute) e unguento oftalmico (trattamento topico di infezioni oculari superficiali batteriche quando sia richiesta un'azione antinfiammatoria).

Talofen:

Le nuove indicazioni terapeutiche sono: trattamento dell'agitazione psicomotoria o del comportamento aggressivo, schizofrenia ed altri disturbi psicotici.

Clorochina Bayer Cortison Chemicetina

Talofen href="http://www.medicoeleggi.com/argomenti000/italia2009/401140.htm"