ANTIBIOTICI DA SOLI SUFFICIENTI PER GUARIRE L'ULCERA DUODENALE ?

Data 30 aprile 1998
Categoria gastroenterologia

81 pazienti affetti da ulcera duodenale attiva HP-positiva sono stati randomizzati in doppio cieco per un trattamento di 2 settimane con tre antibiotici (Metronidazolo 1200 mg + Amoxicillina 2000 mg + Claritromicina 1000 mg) oppure con placebo. Sono stati effettuati controlli clinici ed endoscopici dopo 4, 8 e 12 settimane. L'eradicazione è stata verificata dopo 8 settimane con Urea Breath Test. Risultati: dopo 4 settimane le percentuali di cicatrizzazione erano del 92% con la terapia antibiotica e del 36% col placebo; dopo 8 settimane le percentuali erano del 100% con l'antibioticoterapia e del 61% col placebo, che arrivava al 63% dopo 12 settimane. I tassi di eradicazione con l'antibioticoterapia erano del 63%. Commento personale: a quanto pare l'inibitore di pompa protonica non è indispensabile.
Fonte: (Gut, 1997: 41: 43-48)

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 2/11/2026 alle ore 13:25 | Pagina 1 di 1