



## COVID-19: uno score per predire l'aggravamento

**Data** 24 aprile 2020  
**Categoria** infettivologia

È stato messo a punto un sistema a punteggio, denominato CALL, per individuare i pazienti affetti da COVID-19 a rischio di aggravamento.

Alcuni ricercatori cinesi hanno osservato l'evoluzione di 208 pazienti ricoverati per COVID-19 in un ospedale di Pechino.

In 40 di questi pazienti si è avuto un aggravamento del quadro clinico. Sulla base dei dati registrati gli autori hanno elaborato un **sistema a punteggio (denominato CALL)** che può essere utile per evidenziare quali pazienti sono a rischio di evoluzione grave.

I fattori associati ad un aggravamento erano:

- 1) la presenza di patologie concomitanti
- 2) l'età > 60 anni
- 3) la conta dei linfociti
- 4) i valori della latticodeidrogenasi (LDH).

La tabella sottostante riassume quanto suggerito dallo studio.

[b]The CALL score[/b]

4 punti in presenza di comorbidità  
3 punti per età > 60 anni, 1 punto per età inferiori  
3 punti se conta linfocitaria inferiore a 1000/mm<sup>3</sup>, 1 punto per valori superiori  
1 punto se LDH inferiore a 250 U/L, 3 punti se valori > 500 U/L, 2 punti per valori intermedi  
sottrarre 1 punto in assenza di comorbidità

Usando una soglia di 6 punti il valore predittivo positivo era del 50% e quello negativo del 98%.  
L'area sotto la curva ROC è stata calcolata essere di 0,91.

Gli autori forniscono, alla fine, un sistema pratico per calcolare il rischio:

- a) punteggi fino a 6: basso rischio (10%) di progressione
- b) punteggi da 7 a 9: rischio intermedio (10-40%) di progressione
- c) punteggi  $\geq$  10: rischio elevato (>50%) di progressione

Chedire?

Lo studio è interessante perchè permette di **stratificare i pazienti** in tre fasce di rischio e di monitorare attentamente soprattutto quelli a rischio medio/elevato.

Tuttavia, come si può facilmente comprendere, dovrà essere validato da altri lavori e in altri contesti. Va considerato infatti che i pazienti arruolati avevano in media 44 anni (solo nel 14,9% dei casi l'età era > 60 anni) e che patologie concomitanti erano presenti in poco più del 21% dei casi. In pazienti con caratteristiche diverse lo score potrebbe non essere valido.

**Renato Rossi**



## Bibliografia

1. Ji D et al. Prediction for Progression Risk in Patients with COVID-19 Pneumonia: the CALL score. Clinical Infectious Diseases. Pubblicato online il 9 aprile 2020.  
<https://bit.ly/2RGtip8>