Peginterferone Alfa-2a e ribavirina per l’epatite cronica C

Data 30 dicembre 2002
Categoria epatologia

In questo studio multicentrico, 1121 adulti affeti da epatite cronica C correlata furono trattati per 48 settimane con peginterferone Alfa-2° e ribavirina, interferone alfa-2b e ribavirina o peginterferone alfa-2° e placebo.
Una condizione di remissione virale sostenuta (assenza di HCV RNA dopo 24 settimane dalla cessazione della terapia) fu ottenuta in una percentuale significativamente più alta nei pazienti trattati con peginterferone e ribavirina rispetto agli altri due gruppi di trattamento (rispettivamente 56%, 44% e 29%). Tra i pazienti trattati con pegineterferone e ribavirina, remissioni sostenute si ottennero nel 65% dei pazienti che avevano presentato risposta a 12 settimane (diminuzione di almeno due logaritmi nella concentrazione di HCV RNA), ma solo nel 3% degli altri pazienti. Sintomi similinfluenzali e depressione furono leggermente più frequenti nel gruppo trattato con interferone.

N Engl J Med 2002 Sep 26; 347: 975-82

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 4/11/2026 alle ore 21:9 | Pagina 1 di 1