



Coronavirus: ultime su idrossiclorochina e tocilizumab

Data 29 novembre 2020
Categoria infettivologia

Una rapida sintesi sugli ultimi studi pubblicati su idrossiclorochina e tocilizumab.

Negli ultimi mesi sono stati pubblicati vari studi sulla terapia del coronavirus, in particolare su idrossiclorochina e tocilizumab. Ne diamo una breve sintesi.

Idrossiclorochina

Horby
Studio randomizzato su oltre 4700 pazienti ricoverati per COVID-19: nessuna riduzione dei decessi a 28 giorni nel gruppo idrossiclorochina.

Self
Studio randomizzato su circa 500 pazienti ricoverati da meno di 48 ore per COVID-19: nessuna differenza tra idrossiclorochina e placebo per la mortalità a 28 giorni e per altri parametri clinici.

Mitjà
Studio randomizzato su 2314 soggetti che erano ad alto rischio di infezione per essere stati a contatto stretto con pazienti con COVID-19: la terapia post-esposizione con idrossiclorochina non ha ridotto il rischio di infezione rispetto al controllo.

Tocilizumab

Gupta
Studio osservazionale su oltre 5000 pazienti con COVID-19 e polmonite: nessuna differenza rispetto al controllo per decessi o necessità di intubazione nei pazienti trattati con tocilizumab.

Hermine
Studio randomizzato su circa 130 pazienti ricoverati per polmonite da SARS-CoV-2: nessuna differenza tra tocilizumab e controllo nella mortalità a 28 giorni, riduzione della mortalità e delle ventilazione non meccanica a 14 giorni a favore di tocilizumab.

Salvarani
Studio randomizzato italiano in aperto su 126 pazienti con polmonite da SARS-CoV-2: nessuna differenza a 14 giorni sul peggioramento clinico.

Stone
Studio randomizzato su poco più di 240 pazienti ricoverati per polmonite da COVID-19: nessuna differenza rispetto al controllo su decessi o necessità di intubazione.

Renato Rossi

Bibliografia

1. Horby P et al. Effect of hydroxychloroquine in hospitalized patients with Covid-19. N Engl J Med. Pubblicato 8 ottobre 2020.
2. Self WH et al. Effect of hydroxychloroquine on clinical status at 14 days in hospitalized patients with COVID-19: A randomized clinical trial. JAMA 2020. Pubblicato il 9 novembre 2020.
3. Mitjà O et al for the BCN-PEP-CoV2 research Group. A Cluster-Randomized Trial of Hydroxychloroquine for Prevention of Covid-19. N Engl J Med. Pubblicato il 24 novembre 2020.
4. Gupta S et al. Association between early treatment with tocilizumab and mortality among critically ill patients with COVID-19. JAMA Intern Med. Pubblicato il 20 ottobre 2020.



5. Hermine O et al. Effect of tocilizumab vs usual care in adults hospitalized with COVID-19 and moderate or severe pneumonia: A randomized clinical trial. JAMA Intern Med. Pubblicato il 20 ottobre 2020.
6. Salvarani C et al. Effect of tocilizumab vs standardcare on clinical worsening in hospitalized patients with COVID-19 pneumonia: A randomize clinical trial. JAMA Intern Med. Pubblicato il 20 ottobre 2020.
7. Stone JH et al. Efficacy of tocilizumab in patients hospitalized with Covid-19. N Engl J Med. Pubblicati il 21 ottobre 2020.