

## La sindrome da sensibilità chimica multipla

31 luglio 2022 Data Categoria scienze\_varie

Una breve sintesi su una strana patologia: la sindrome da sensibilità chimica multipla.

La sindrome da sensibilità chimica multipla (multiple chemical sensivity syndrome, MCS), detta anche intolleranza ambientale idiopatica, è una condizione cronica caratterizzata dalla comparsa di una varietà di sintomi dopo l'esposizione (o la ritenuta esposizione) a bassi livelli di sostanze chimiche generalmente sopportati da altre persone.1-5

Tra le sostanze più spesso implicate ricordiamo:

 petrolio e suoi derivati;

 gas di scarico delle auto;  formaldeide;  plastica;

 prodotti di pulizia per la casa;  vernici;

 profumi;  pesticidi;  fumiindustriali.

Non vi sono test o accertamenti che possano spiegare tali sintomi e, in realtà, vi è ampio dibattito se questa sindrome esista. Attualmente non vi sono criteri universalmente accettati di riferimento per la diagnosi.

I sintomi compaiono dopo l'esposizione a un supposto agente chimico e regrediscono in seguito alla sua rimozione.

La sintomatologia è di tipo aspecifico e interessa sia il sistema nervoso che altri organi:

 astenia,malessere;  senso di nausea, sudorazione;

 palpitazioni,tachicardia;

 vertigini, cefalea, disturbi della memoria;

 mialgie,artralgie;

 dispnea, iperventilazione;  dolore addominale, diarrea;

 sintomi psichici (ansia, depressione).

Data l'estrema varietà dei sintomi denunciati, la frequente sovrapposizione con altre condizioni caratterizzate da sintomi clinicamente inspiegabili (sindrome da fatica cronica, fibromialgia, ecc.) e la mancanza di criteri diagnostici è comprensibile come l'esistenza stessa della sindrome sia stata messa in discussione.

La prevalenza della MCS è difficile da stimare a causa della mancanza di criteri standardizzati di diagnosi e dei differenti risultati dei vari studi.

La prevalenza su pazienti studiati dal punto di vista medico arriva fino al 6,5% e dipende ovviamente anche dal tipo di campione soggetto all'analisi. La prevalenza autoriferita va dal 9% all'11,2%.6

#### Teoriepatogenetiche

Sono state elaborate numerose teorie sui meccanismi etiopatogenetici che potrebbero essere all'origine di questa stranaentità:

- 1) alterazioni del sistema olfattivo
- 2)teorie psicologiche
- 3) teoria del condizionamento
- 4) teoria dell'infiammazione neurogena
- 5) alterazioni del sistema limbico e ipersensibilizzaione neuronale
- 6) stress ossidativo
- 7) ipotesi genetica.

#### **Terapia**

La terapia è sintomatica, talora vengono usati antidepressivi. Un panel di esperti ha elaborato un consenso al quale si rimanda per i consigli di trattamento (mascherine, depuratori d'aria, rimozione dall'ambiente della sostanza sospetta, ecc.).



### RenatoRossi

# Bibliografia

1. Damiani G et al. Italian Expert Consensus on Clinical and Therapeutic Management of Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 27;18(21):11294.