Il diabete aumenta il rischio cardiovascolare più nelle donne che negli uomini

Data 14 luglio 2004
Categoria cardiovascolare

Il diabete mellito, indipendentemente da altri fattori, aumenta di due volte il rischio di morte, sia negli uomini che nelle donne, ma in quest'ultime determina un rischio significativamente maggiore rispetto agli uomini per IMA e Ictus.

Un totale di 13105 soggetti arruolati nel Copenhagen City Heart Study sono stati seguiti prospetticamente per 20 anni. Il rischio relativo del primo IMA è risultato aumentato ripetto ai non diabetici da 1.5 a 4.5-volte nelle donne e da 1.5 a 2 volte negli uomini, (differenza significativa tra sessi). Il rischio relativo per il primo stroke è risultato aumentato da 2 a 6.5 volte nelle donne e da 1.5 a 2 volte negli uomini (differenza significativa tra sessi). Il rischio di morte è risultato egualmente aumentato in entrambi i sessi da 1.5 a 2 volte rispetto ai non diabetici.

fonte: Arch Intern Med. 2004;164:1422-1426.

© 2004 - 2026 Pillole - Registrazione T. di Roma n. 2/06 | stampato il 12/10/2026 alle ore 2:10 | Pagina 1 di 1